


Dans les études cliniques, il y a eu moins de 5 % des applications où le comprimé s'est décroché de la muqueuse gingivale. Afin de prévenir les risques de décrochage du comprimé, il est important d'informer le patient sur les modalités d'applications du comprimé de Loramyc<sup>®</sup>.

Du fait d'un flux salivaire moins important la nuit, il est préférable de conseiller au patient d'appliquer le comprimé de Loramyc<sup>®</sup> le matin après le petit déjeuner et le brossage des dents.

## COMMENT LE POSITIONNER ?<sup>(1)</sup>

- Le patient doit appliquer, la face bombée du comprimé sur la gencive, dès sa sortie du flacon.
- Le comprimé doit être positionné sur la gencive supérieure au-dessus d'une incisive.
- Le comprimé doit être maintenu en place pendant **30 secondes** avec une légère **pression du doigt sur la lèvre**.
- Il est recommandé de changer de côté à chaque application.



## EN CAS DE BOUCHE SÈCHE ?

### • Au moment de la pose

- Il est recommandé de faire un bain de bouche avec de l'eau avant la pose du comprimé afin d'humidifier la muqueuse gingivale.
- Le comprimé peut également être humidifié avec la langue avant de le positionner sur la gencive.

### • Au cours de la journée

- Humidifier la gencive avec un spray d'eau minérale.

## MISES EN GARDE :

- Éviter toutes situations qui pourraient perturber l'adhésion du comprimé (exemple : mâcher un chewing gum).
- Le comprimé ne doit pas être sucé, mâché ou avalé.
- En cas d'ingestion accidentelle du comprimé, il est recommandé de boire un verre d'eau.

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez (coordonnées disponibles sur le site Internet de l'ANSM [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr) ou dans le Dictionnaire Vidal<sup>®</sup>).