

INFORMATION DE L'UTILISATEUR

GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
2. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
3. Si les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 15 jours, consultez un médecin.
4. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

5. QU'EST-CE QUE GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ET DANS QUELS EST-IL UTILISE ?
6. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ?
7. COMMENT UTILISER GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ?
8. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
9. COMMENT CONSERVER GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ?
10. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

STOMATOLOGIE/TRAITEMENT LOCAL A VISEE ANTISEPTIQUE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est préconisé dans le traitement local d'appoint des affections de la bouche chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ?

N'utilisez jamais GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale dans les cas suivants :

- Allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (anti-inflammatoires, aspirine), ou à un autre des constituants.
- Enfant de moins de 6 ans

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Faites attention avec GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale :

Mises en gardes spéciales

- Certains constituants de ce médicament (eucalyptol, menthol, thymol), ont pu entrainer, à dose excessive, des accidents neurologiques à type de convulsions chez les enfants.
Respectez les conseils d'utilisation et la posologie préconisés dans cette notice.
- En cas d'aggravation des symptômes, de fièvre ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, consultez votre médecin.

Précautions d'emploi

- En cas d'antécédents d'épilepsie, demander conseil à votre médecin.
- Dès l'ouverture du conditionnement, une contamination microbienne est possible.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipient à effet notoire : rouge cochenille A (E 124)

3. COMMENT UTILISER GLYCO-THYMOLINE, solution buccale ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

Ne pas avaler, ne pas appliquer sur la peau ou les muqueuses autres que la muqueuse buccale.

Usage local. 2 à 3 fois par jour :

- Application du produit non dilué sur les zones à traiter, à l'aide de compresses ou d'un coton.
- Ce produit peut s'employer en bains de bouche : utiliser le produit dilué pour moitié avec de l'eau chaude.

Mode et voie d'administration

USAGE BUCCAL STRICT

Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité de réactions allergiques et d'irritation locale.
- En cas de non respect des doses préconisées :
 - risque de convulsions chez l'enfant,
 - possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.

Pas de conditions de conservation particulières.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale ?

Les substances actives sont :

Benzoate de sodium.....	2,040 g
Salicylate de sodium.....	0,090 g
Borax.....	2,000 g
Thymol.....	0,037 g

Cinéole	0,075.g
Lévomenthol	0,037 g

Pour 100 g de solution buccale

Les autres composants sont :

Huile essentielle de pin sylvestre, bicarbonate de sodium, glycérol, alcool, polysorbate 80, rouge cochenille A (E124), eau purifiée.

Qu'est-ce que GLYCO-THYMOLINE 55, solution buccale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buccale, flacons de 200 ml, 250 ml, 500 ml ou 1000 ml.

Titulaire / Fabricant / Exploitant

SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES (S.E.R.P.)

Immeuble Le Triton
5 rue du Gabian
98000 MONACO

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 6 octobre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).