

Belivair® TOUX

QU'EST CE QUE LE SIROP BELIVAIR TOUX ?

Le sirop Belivair TOUX est un dispositif médical indiqué dans la toux sèche ou grasse.

Sa formule spécifique crée un film muco-adhésif protecteur à effet barrière sur les parois de la gorge.

Ainsi, en cas de toux sèche, le sirop Belivair TOUX calme la toux en protégeant la muqueuse des agents irritants. Et lors d'une toux grasse, il favorise l'hydratation du mucus afin d'en faciliter l'expectoration physiologique.

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DU SIROP BELIVAIR TOUX ?

Grâce à ses extraits 100% naturels ayant prouvé leur efficacité, le sirop Belivair TOUX :

- Calme la toux en créant un film muco-adhésif protecteur à effet barrière.
- Protège les voies respiratoires supérieures des agressions extérieures (froid, fumée, pollution).
- Facilite l'expectoration physiologique en activant l'hydratation du mucus et en entraînant avec lui les agents irritants déposés dans la gorge.

Le sirop Belivair TOUX se compose de 4 ingrédients.

- Du lierre, dont les saponines qu'il contient ont un effet émulsifiant et fluidifiant sur le mucus.
- De la guimauve, riche en mucilages, ayant la capacité de tapisser les muqueuses.
- Du thym, reconnu pour ses propriétés antioxydantes, qui protège les muqueuses.
- Du miel formant un film protecteur adoucissant.

QUE CONTIENT LE SIROP BELIVAIR TOUX ?

Extrait de lierre titré et standardisé en hédéragénine, miel, extrait de guimauve riche en mucilage, extrait de thym, fructose, eau purifiée, gomme xanthane, huile essentielle de citron, arôme de fraise, acide citrique, sorbate de potassium, benzoate de sodium. Sans gluten.

COMMENT UTILISER LE SIROP BELIVAIR TOUX ?

Agiter le flacon avant chaque utilisation.

Utiliser le gobelet doseur gradué à 5 ml et 10 ml.

Prendre le sirop Belivair TOUX de préférence entre les repas.

- **Enfants de 2 à 4 ans** : 5 ml par prise, 2 fois par jour.
- **Enfants de plus de 4 ans** : 10 ml par prise, 2 fois par jour.
- **Adultes** : 10 ml par prise, 3 fois par jour.

Pour les enfants de moins de trois ans, demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.

Consulter un médecin si les symptômes persistent après une semaine de traitement.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI À SUIVRE ?

- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité, d'allergie ou d'intolérance à un ou plusieurs composants (fructose).
- Bien refermer le flacon après utilisation.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
- La date de péremption s'applique au produit non ouvert et conservé dans son emballage d'origine.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas utiliser un sirop cassé ou endommagé.
- Conserver dans son emballage d'origine à température ambiante et dans un endroit sec.

Sirop de 120 ml avec gobelet doseur  0373

Dispositif médical de classe II a

Révision: Décembre 2015

FABRICANT :

Labomar, Srl
Via N. Sauro 35/1
31036 Istrana (TV) - Italie

DISTRIBUTEUR :

Therabel Lucien Pharma
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris - France

