

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Grossesse :

Votre médecin peut être amené à prescrire ce médicament au cours de la grossesse.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament doit être évitée lors de l'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

Sucer lentement les comprimés, sans les croquer ni les avaler, jusqu'au délitement complet.

5 à 10 comprimés par jour, en répartissant les prises.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

– IL NE PEUT PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS.

– NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie buccale.

Durée du traitement

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

– rarement candidoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la bouche ou du pharynx régressant à l'aide d'un traitement approprié.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

MAI 2001.

Buccobet 0,1mg, comprimé à sucer

BETAMETHASONE

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination

BUCCOBET® 0,1 mg, comprimé à sucer.

Composition qualitative et quantitative

VALÉRATE DE BÉTAMÉTHASONE.....0,122 mg

(Quantité correspondante en bétaméthasone à0,100 mg)

Excipients : lactose monohydraté, gomme arabique, stéarate de magnésium.

Pour un comprimé à sucer

Forme pharmaceutique

Comprimé à sucer sous plaquette thermoformée, boîte de 50.

Classe pharmacothérapeutique

CORTICOSTÉROÏDE (R : système respiratoire).

Nom et adresse de l'exploitant

DB PHARMA - 1, bis rue du Commandant Rivière

94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

Titulaire de l'AMM

CLS PHARMA - 8 rue du Bac 92150 SURESNES

Fabriqué par

Laboratoires MACORS - 89000 AUXERRE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans les aphtes, les inflammations de la bouche, des gencives ou de la gorge.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

– chez l'enfant de moins de 6 ans,

– antécédents d'allergie à l'un des composants,

– lésions buccales dues à un virus (herpès buccal, varicelle...).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

Il est impératif de respecter les posologies prescrites par votre médecin ainsi que les conditions d'utilisation de ce médicament.

Si les lésions s'étendent, comme en cas d'apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.