NON SUBSTITUABLE1





NOUVEAUX FORMATS



Hydrocellulaire siliconé pratique De la détersion* jusqu'à épidermisation







Taille	Taille de la compresse	Boîtage	Code ville
8 x 8 cm	4,5 x 4,5 cm	16	35468.900.000.6.7
10 x 12 cm	5,9 x 5,9 cm	16	35468.900.425.6.2
13 x 15 cm	8,3 x 8,4 cm	16	35468.900.425.2.4
17 x 20 cm	10,4 x 14,7 cm	16	35468.900.425.5.5
20 x 20 cm (sacrum)	12,6 x 14,3 cm	16	35468.900.000.9.8





Hydrocellulaire découpable De la détersion* jusqu'à épidermisation









Taille	Boîtage	Code ville
6 x 6 cm	16	35468.900.401.9.3
13 x 12 cm	16	35468.900.402.8.5
15 x 20 cm	16	35468 900 402 61





Hydrocellulaire non adhésif Dès la détersion* jusqu'à epidermisation







	Taille	Boîtage	Code ville	
П	15 x 20 cm	16	35468,900,413,4,3	

NOUVEAUX FORMATS À VENIR EN SEPTEMBRE 2025

6 x 6 cm 10 x 10 cm 13 x 12 cm

NON SUBSTITUABLE



UrgoK2



Le système multitype qui garantit une compression continue et fiable²

Taille	Largeur de bandes	Contenu par boîte	Code ville
18 -25 cm	10 cm		34010.967.457.9.5
25 - 32 cm	10 cm	_	34010.967.458.5.6
18 - 25 cm (Latex Free)	10 cm	2 bandes**	34010.206.449.3.4
18 - 25 cm (Latex Free)	10 cm	_	34010.206.448.7.3

UrgoK2 existe également en largeur de bandes : 8 cm et 12 cm.

NON SUBSTITUABLE¹

COMMENT PRESCRIBE:

- Écrire « UrgoStart Plus Border », « UrgoStart Plus Compresse ».
- « UrgoStart Plus Absorb », et « UrgoK2 »en toutes lettres.
 - Indiquer la taille souhaitée
 - Indiquer la fréquence de renouvellement
 - Indiquer le nombre de boîtes
 - Indiquer la mention 'non-substituable'

* Hors nécrose sèche.** 1 bande blanche - 1 bande beige. *** Hors UrgoK2 Latex Free.

 Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant. 2. Jünger M. et al., Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems. J Wound Care 2009: 18(11): 474-80.

Gammes UrgoStart et UrgoStart Plus: Dispositifs Médicaux de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursables LPPR (Sc. Soc. : 60% + Muttelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuroischémique (sichemie non critique), non infecté (critières d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Indications: Traitement des plaies cutanées suivantes: ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation Contre-indications: plaies cancéreuses, fistuleuses, necrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyrethylcellulose (CMC). Urgok2 et Urgok2 et turpeq 2 de compression multityees bi-bande à pression contrôlée. Traitement de l'ulcère

Urgok2 et UrgoK2 Latex Free: Système de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Traitement de l'ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée, chez l'adulte. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuxe (IIPS ≥ à 0.8). Dispositifs Médicaux de classe I.

Avis CNEDIMTS disponibles sur le site https://www.has-sante.fr/.

Lire la notice des produits avant utilisation (notamment pour les précautions d'emploi et contre-indications).





