

## Que faut-il savoir sur Xarelto ?

- ◆ Xarelto fluidifie le sang, ce qui protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- ◆ Xarelto doit être pris exactement comme le médecin l'a prescrit. **Ne jamais sauter une dose du médicament** afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- ◆ Vous ne devez jamais arrêter de donner/prendre Xarelto sans en parler d'abord au médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.

- ◆ Informez le médecin ou pharmacien si vous/l'enfant prenez/prend, avez/a récemment pris ou pourriez/pourrait prendre tout autre médicament, avant de prendre Xarelto.
- ◆ Informez le médecin que vous/l'enfant êtes/est traité par Xarelto avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

## Quand dois-je demander conseil à un médecin ou à un pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Xarelto, il est important de connaître les éventuels effets indésirables.

Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous/l'enfant présentez/présente un risque de saignement inhabituel, il ne faut pas commencer à donner/prendre Xarelto sans en avoir parlé d'abord avec un médecin. Prévenez immédiatement un professionnel de santé si vous/l'enfant présentez/présente des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- ◆ douleurs
- ◆ gonflement ou sensations d'inconfort
- ◆ maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ◆ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper
- ◆ menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire

- ◆ sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- ◆ si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café

## Comment dois-je donner Xarelto à l'enfant ? / Comment dois-je prendre Xarelto ?

- ◆ Pour garantir une protection optimale, Xarelto 1 mg/mL doit être donné/pris au cours de l'alimentation (lait maternel ou lait infantile) ou au cours d'un repas.
- ◆ Il peut être administré via une sonde nasogastrique ou une sonde gastrique.

**Carte de Surveillance du Patient**

 **Xarelto® 1 mg/mL**  
Granulés pour suspension buvable

### Informations aux aidants/patients :

- ◆ **Gardez toujours cette carte sur vous**
- ◆ **Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste avant de commencer un traitement pour le patient**

Regardez la vidéo éducative montrant comment préparer et administrer la suspension buvable



[go.bayer.com/junior](http://go.bayer.com/junior)

**Le patient qui est sous traitement  
anticoagulant par Xarelto (rivaroxaban).**

Nom : \_\_\_\_\_ Autres médicaments/Pathologies : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Date de naissance : \_\_\_\_\_ Poids : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**En cas d'urgence,  
veuillez prévenir :**

Nom du médecin : \_\_\_\_\_  
Téléphone du médecin : \_\_\_\_\_  
Cachet du médecin : \_\_\_\_\_

**Veuillez aussi prévenir :**

Nom : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_  
Lien avec le patient : \_\_\_\_\_

**Information à  
destination des  
professionnels de santé :**

◆ Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Xarelto.



Bayer