



MOLÉCULE	Sécukinumab
FORME	Solution injectable en seringue ou stylo / Poudre pour solution injectable
CLASSE ATC	Immunosuppresseurs, inhibiteurs de l'interleukine (Code : L04AC10)
LABORATOIRE	NOVARTIS Pharma SAS 8/10, Rue Henri-Sainte-Claire-Deville. CS 40150. 92563 Rueil-Malmaison cdx Information et Communication Médicales : 01 55 47 66 00 <a href="mailto:icm.phfr@novartis.com">icm.phfr@novartis.com</a>

## INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

PRÉSENTATION	CODE CIP	LISTE	PRIX T.T.C.	SÉC. SOC.*
COSENTYX® poudre pour solution injectable à 150 mg, 1 flacon	3400930010594	I	487,93 €	65 %
COSENTYX® solution injectable à 150 mg/ml, 1 seringue préremplie	3400930010600	I	487,93 €	65 %
COSENTYX® solution injectable à 150 mg/ml, 1 stylo prérempli	3400930010624	I	487,93 €	65 %
COSENTYX® solution injectable à 150 mg/ml, 2 seringues préremplies	3400930010617	I	947,58 €	65 %
COSENTYX® solution injectable à 150 mg/ml, 2 stylos préremplis	3400930010631	I	947,58 €	65 %
COSENTYX® solution injectable à 300 mg/2 ml, 1 seringue préremplie	3400930216361	I	947,58 €	65 %
COSENTYX® solution injectable à 300 mg/2 ml, 1 stylo prérempli	3400930216378	I	947,58 €	65 %

\* Pour voir quelles sont les indications remboursées, se reporter à la monographie.

## PRESCRIPTION

- Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle
- Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en dermatologie, en rhumatologie, en médecine interne ou en pédiatrie
- Médicament d'exception : prescription en conformité avec la FIT

## INFORMATIONS MÉDICALES

### INDICATIONS

Pour voir le détail des indications, se reporter à la monographie :

- Psoriasis en plaques (adulte)
- Psoriasis en plaques (enfant et adolescent ≥ 6 ans)
- Rhumatisme psoriasique (adulte)
- Spondyloarthrite ankylosante (adulte)
- Spondyloarthrite axiale non radiographique (adulte)

### SCHÉMA POSOLOGIQUE

Pour voir le schéma posologique selon les indications et les populations cibles, se reporter à la monographie

### MODALITÉS D'ADMINISTRATION

- Injection SC. Si possible, ne pas injecter sur les zones de peau lésées par le psoriasis
- **Seringues et stylos préremplis** : ne pas agiter. Après une formation adéquate, les patients peuvent s'injecter eux-même ou se faire injecter COSENTYX®. Informer les patients de la nécessité d'injecter la totalité du contenu de COSENTYX®
- **Poudre pour solution injectable** : la reconstitution, la préparation de la dose et l'administration doivent être réalisées par un professionnel de santé, des instructions détaillées concernant l'administration sont fournies dans la notice

## INFOS PRATIQUES

- Usage unique
- Sortir le stylo ou la seringue du réfrigérateur 20 min avant l'injection (COSENTYX® 150 mg) ou 30 à 45 min avant l'injection (COSENTYX® 300 mg)
- **Conservation** :
  - **Seringues et stylos préremplis** : 18 mois au réfrigérateur, entre 2 °C et 8 °C dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Si nécessaire, COSENTYX® peut être conservé en dehors du réfrigérateur, 1 seule fois, jusqu'à 4 jours à température ambiante, sans dépasser 30 °C
  - **Flacons de poudre** : cf. la monographie

## VIGILANCE

### CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
- Infection évolutive et cliniquement grave, par exemple une tuberculose active

### EFFETS INDÉSIRABLES

- **Très fréquents (≥ 1/10)** :
  - Infections des voies respiratoires hautes
- **Fréquents (≥ 1/100, < 1/10)** :
  - Herpès buccal, pied d'athlète (*Tinea pedis*)
  - Céphalée
  - Rhinorrhée
  - Fatigue
  - Diarrhée, nausée

Pour voir l'ensemble et le détail des effets indésirables, cf. Effets indésirables de la monographie

SUITE

AVRIL 2022

## VIGILANCE (suite)

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Infections** : patients avec une infection chronique ou des antécédents d'infections récidivantes, envisager l'utilisation de COSENTYX® avec précaution. Si signes ou symptômes d'infection, consulter un médecin. Si infection grave, ne pas administrer COSENTYX® avant guérison de l'infection. Si tuberculose active, ne pas administrer COSENTYX® et si latente, envisager un traitement antituberculeux avant l'initiation
- **Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (dont maladie de Crohn et rectocolite hémorragique)** : COSENTYX® n'est pas recommandé. Si survenue de signes ou symptômes ou exacerbation d'une maladie préexistante, arrêter COSENTYX® et initier une prise en charge médicale appropriée
- **Réactions d'hypersensibilité** : si survenue de réactions anaphylactiques ou autres réactions allergiques grave, interrompre COSENTYX® immédiatement et instaurer un traitement approprié
- **Personnes sensibles au latex\*** : un risque d'hypersensibilité ne peut pas être totalement exclu
- **Vaccinations** : ne pas co-administrer de vaccins vivants. Avant l'initiation, il est recommandé que les patients pédiatriques reçoivent toutes les vaccinations adaptées à leur âge
- **Traitement immunosuppresseur concomitant** : précautions à prendre

\* Uniquement COSENTYX® 150 mg solution injectable en seringue préremplie et en stylo prérempli

- **FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER** : utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et au moins 20 semaines après l'arrêt
- **GROSSESSE** : par mesure de précaution, éviter COSENTYX® pendant la grossesse
- **ALLAITEMENT** : soit interrompre l'allaitement pendant le traitement et jusqu'à 20 semaines après l'arrêt du traitement, soit interrompre le traitement par COSENTYX®

Pour voir le détail des mises en garde, cf. **Mises en garde** de la monographie

### INTERACTIONS

- **Vaccins vivants** : ne pas les co-administrer

Pour voir le détail des interactions, cf. **Interactions** de la monographie

Cliquez ici  
pour voir  
la monographie

