


Check-list prescripteur Emerade®



CHECK-LIST PRESCRIPTEUR EMERADE®

Emerade® est un stylo pré-rempli (auto-injecteur) délivrant une dose unique d'adrénaline.

Emerade® est indiqué dans le traitement d'urgence des réactions allergiques aiguës sévères (chocs anaphylactiques) provoquées par des allergènes présents dans les aliments, les médicaments, les piqûres ou les morsures d'insectes et d'autres allergènes, ainsi que pour le traitement de l'anaphylaxie induit par l'effort ou le choc anaphylactique idiopathique.

La formation des patients et de leur entourage immédiat (parents, personnels soignants, enseignants) est essentielle pour garantir une manipulation correcte et rapide de l'auto-injecteur et ainsi l'administration d'adrénaline dans les situations d'urgence.

La spécialité Emerade® fait l'objet d'un plan de gestion des risques (PGR) pour réduire les risques d'erreur d'administration.

L'objectif de cette check-list, élaborée dans le cadre du PGR, est de vous aider en tant que prescripteur à former le patient et/ou le personnel soignant à l'utilisation correcte, le stockage et l'entretien d'Emerade®. La check-list peut être utilisée comme un outil d'enseignement général ou pour vous aider lors de vos consultations.

Vous devez remettre aux patients les éléments de réduction du risque (trainer et brochure patient Emerade®) validés à cet égard et les inciter à visionner la vidéo d'utilisation de l'auto-injecteur Emerade®, proposée sur le site www.emerade-bausch.fr.

Il est nécessaire de prescrire à votre patient 2 auto-injecteurs Emerade®.



Déclaration des effets indésirables

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez (coordonnées disponibles sur le site internet de l'ANSM www.ansm.sante.fr ou dans le Dictionnaire Vidal®).

Vous prescrivez à votre patient l'auto-injecteur d'adrénaline Emerade®. Merci de vous assurer en tant que prescripteur, que vous êtes en mesure de répondre "oui" aux questions ou affirmations suivantes, relatives à la prescription, la formation de l'utilisateur et à la conservation d'Emerade®.

Nom du patient :

PRESCRIPTION

Le patient pèse-t-il entre 15 kg et 30 kg ? *Prescrire Emerade® 150 microgrammes.*

Le patient pèse-t-il entre 30 kg et 60 kg ? *Prescrire Emerade® 300 microgrammes.*

Le patient pèse-t-il plus de 60 kg ? *Prescrire Emerade® 300 microgrammes ou Emerade® 500 microgrammes en fonction du diagnostic clinique.*

J'ai prescrit 2 auto-injecteurs Emerade® au patient.

Le patient a compris l'importance d'avoir en permanence avec lui 2 auto-injecteurs Emerade®, dans le cas où une seule injection ne suffirait pas à améliorer les symptômes lors d'une anaphylaxie.

MODE D'EMPLOI

Le patient connaît les symptômes d'une anaphylaxie et je lui ai expliqué dans quelles situations Emerade® doit être utilisé.

J'ai expliqué au patient comment utiliser correctement l'auto-injecteur Emerade® à l'aide du mode d'emploi présenté au verso de ce document.

J'ai indiqué au patient de composer le 15 ou le 112 immédiatement après avoir utilisé Emerade®, et de demander l'intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie » et ce, même si les symptômes semblent s'améliorer.

J'ai indiqué au patient que si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent 5 à 15 minutes après la première injection d'Emerade®, il devra procéder à l'administration d'une nouvelle dose, en utilisant un 2^{ème} auto-injecteur Emerade®.

J'ai remis au patient un trainer Emerade® (stylo de démonstration sans adrénaline ni aiguille) afin de s'entraîner et de savoir agir lors d'une situation allergique critique.

J'ai demandé au patient de ne pas transporter ou stocker le trainer avec les auto-injecteurs Emerade®.

J'ai remis au patient la brochure d'information patient expliquant comment utiliser l'auto-injecteur Emerade® et réduire les risques d'erreur d'administration.

J'ai incité le patient à visionner la vidéo d'utilisation de l'auto-injecteur Emerade® diffusée sur le site internet www.emerade-bausch.fr.

CONSERVATION

J'ai indiqué au patient de conserver les auto-injecteurs Emerade® à l'abri de la lumière, dans leur boîte, à une température ne dépassant pas 25°C et de ne pas les mettre au congélateur.

J'ai indiqué au patient d'examiner régulièrement la solution à travers la fenêtre de contrôle de l'auto-injecteur en soulevant l'étiquette afin de vérifier que la solution est limpide et incolore, et de remplacer les auto-injecteurs Emerade® si la solution est colorée ou contient un précipité (des particules solides).

J'ai indiqué au patient de vérifier régulièrement la date de péremption de ses auto-injecteurs Emerade® afin de les remplacer si nécessaire.

J'ai recommandé au patient d'enregistrer un rappel de la date de péremption de ses auto-injecteurs Emerade® dans son téléphone ou sur le site internet www.emerade-bausch.fr.

Signature du prescripteur :

Date :

COMMENT UTILISER L'AUTO-INJECTEUR EMERADE® ?

Chaque auto-injecteur Emerade® est à usage **unique**.
Vérifiez à travers la fenêtre de contrôle, sous l'étiquette, que la solution est limpide et incolore.



► **Retirez** la protection de l'aiguille.



► **Appliquez** Emerade® contre la face externe de la cuisse puis appuyez. On entend un bruit sec au moment de l'injection dans le muscle. Maintenez le stylo contre la cuisse pendant **5 secondes**.

Puis massez doucement la zone d'injection.

Ensuite, même si les symptômes semblent s'améliorer, **composez le 15 ou le 112**, demandez une ambulance, dites que vous faites une anaphylaxie et que vous avez reçu une injection intramusculaire d'adrénaline.

En attendant l'ambulance, allongez-vous avec les jambes légèrement surélevées ou bien asseyez-vous en cas de difficultés à respirer. Demandez à quelqu'un de rester à vos côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, dans le cas où vous vous sentiriez mal à nouveau.

Si **les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent** dans les **5 à 15 minutes** qui suivent la première injection, vous ou la personne vous accompagnant, devez procéder à **une seconde injection**, avec un autre stylo Emerade®.

C'EST POURQUOI VOUS DEVEZ AVOIR EN PERMANENCE SUR VOUS 2 AUTO-INJECTEURS EMERADE®.

BAUSCH + LOMB

LABORATOIRE CHAUVIN
416 RUE SAMUEL MORSE - CS 99535
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
