

Cenexi for DEGLAUDE
Article 28036446
BECILAN 250MG 5AMPS P & HOP
Leaflet (page 1/2)
148 mm x 210 mm
Packaging line : Dividella
Version 3 - 20.04.2011
Modification de texte

Customer approval:
Nom: DEUTSCH
Fonction: Pharm Rep
Date: 20/04/11
Visa:

Technical approval:
Nom:
Fonction:
Date:
Visa:

Liberation CD
Date:
Visa:

28036446



Bécilan® 250 mg/5 ml, solution injectable

Chlorhydrate de pyridoxine

COMPOSITION QUALITATIVE

Principe actif : chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B₆)
Excipients : hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, sulfite de sodium anhydre, eau pour préparations injectables. Gaz d'inertage : azote

COMPOSITION QUANTITATIVE

Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B₆)..... 250 mg (pour une ampoule de 5 ml)

Médicament autorisé n° 327 254.9

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU EN UNITÉS DE PRISES

Solution injectable, ampoule de 5 ml, boîte de 5.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

VITAMINE B6 (A : Appareil digestif et métabolisme)

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

LABORATOIRES THÉRANOL-DEGLAUDE 72, rue du Fg St-Honoré 75008 PARIS

NOM ET ADRESSE DU LABORATOIRE EXPLOITANT

LABORATOIRES D.B. PHARMA
1, bis rue du Cdt Rivière 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

CENEXI 52, rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (indications thérapeutiques)

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement des carences en vitamine B₆ confirmées par le médecin, lorsque la voie orale n'est pas possible.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :
- en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- en association avec la lévodopa.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Ce produit contient des sulfites pouvant éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type anaphylactique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



28036446

<p>Cenexi for DEGLAUDE Article 28036446 BECILAN 260MG 5AMPS P & HOP Leaflet (page 2/2) 148 mm x 210 mm Packaging line : Dividella Version 3 - 20.04.2011 Modification de texte</p>	<p>Customer approval:</p>	<p>Technical approval:</p>	<p>Liberation CD</p>
	<p>Nom: <u>DEGLAUDE</u> Fonction: <u>Pharm. Resp.</u> Date: <u>20/4/10</u> Visa: <u>[Signature]</u></p>	<p>Nom: Fonction: Date: Visa:</p>	<p>Date: Visa:</p>



GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement. En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Sulfite de sodium

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

RÉSERVÉ A L'ADULTE. 1 à 2 ampoules par jour.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire ou intraveineuse.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser de façon prolongée. Respecter les doses préconisées.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (effets indésirables)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement suite à des fortes doses et/ou en cures prolongées.

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Avant ouverture : A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Après ouverture, le produit doit être utilisé immédiatement.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Mars 2011.

28036446



28036446