


ORMELLE - LA NOTICE - IFU (Instructions for use)



1) LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DONNÉES CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LES PRÉSERVATIFS FÉMININS ORMELLE.

Les préservatifs féminins ORMELLE sont conçus de latex naturel de première qualité. Ils sont conformes aux normes internationales ISO 25841 et sont marqués CE 2460. Les préservatifs féminins ORMELLE sont bien lubrifiés. Le produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, dont des chocs anaphylactiques si l'utilisateur est allergique. Il est alors nécessaire de consulter un médecin Les préservatifs féminins ORMELLE augmentent le plaisir sexuel tout en protégeant des grossesses indésirables et des infections sexuellement transmissibles. Utilisez correctement, les préservatifs féminins ORMELLE sont conçus pour offrir une protection contre les grossesses et les infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. L'utilisation des préservatifs féminins ORMELLE peut sembler un peu maladroite la première fois, mais elle est de plus en plus facile avec un peu de pratique. Beaucoup de couples semblent trouver plaisir à la mise en place du préservatif féminin. Vous pouvez choisir la position qui vous convient le mieux pour le mettre en place. La plupart des couples trouvent plus facile d'intégrer la pose du préservatif au cours des préliminaires. Certaines femmes trouvent l'anneau interne légèrement inconfortable au début. En cas de sensation d'inconfort, vérifiez qu'il a été inséré assez profondément. Insérez le préservatif féminin ORMELLE dans le vagin avant tout contact entre le vagin et le corps du partenaire, afin de contribuer à prévenir les infections sexuellement transmissibles et les grossesses. Vous nous conseillons de lire attentivement les instructions avant toute utilisation d'un préservatif féminin ORMELLE et d'apprendre à l'utiliser correctement. Il est vivement déconseillé d'utiliser des préservatifs endommagés ou périmés. Vérifier la date de péremption avant d'ouvrir le sachet et vérifier que le préservatif n'est pas endommagé. Ne pas utiliser les préservatifs après la date d'expiration qui figure sur l'emballage. Ouvrir le film d'emballage, et retirer soigneusement le préservatif. Veller à l'endommagement en aucun cas le préservatif. Si le sachet individuel est endommagé, jeter le préservatif et utiliser un préservatif neuf provenant d'un emballage intact. On n'a jamais tardé de le même préservatif. Utiliser toujours un préservatif neuf à chaque rapport sexuel. Consultez votre médecin dès que possible, au plus tard dans les 72 heures, en cas de problème avec le préservatif. Demandez conseil à votre médecin au vu de votre phamacion sur la compatibilité des éventuels traitements topiques qui risqueraient d'être en contact avec les préservatifs féminins. Les préservatifs féminins sont strictement à usage unique et on ne peut pas le laver et le réutiliser sous peine de compromettre l'efficacité et l'intégrité du préservatif. Enter tout contact du préservatif avec de l'huile sous toutes ses formes (pétrole, gel, huile pour bébé, huile minérale, huile de moutarde, huile végétale, huile de massage, lotion pour bébé, beurre, etc.), qui risquent d'endommager le préservatif. Ne pas utiliser de talc ni de poudre pour bébé pouvant contenir de l'huile. Si les préservatifs contiennent un lubrifiant supplémentaire, ne choisir que ceux qui sont à base d'eau, compatibles avec les préservatifs. Ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile. Enter tout contact du préservatif avec les ongles, les bijoux, des ciseaux, les dents ou tout objet tranchant qui risquerait de l'endommager. Les préservatifs féminins sont biodegradables. Enter le préservatif de manière écologique et hygiénique, en l'enveloppant dans un mouchoir en papier avant de le mettre à la poubelle. Aucune méthode de contraception dite de barrière, y compris les préservatifs masculins et féminins, ne protège à 100% des risques de grossesses et d'infections sexuellement transmissibles.

Il faut tenir compte de certains inconvénients spécifiques aux préservatifs féminins qui pourraient nuire à leur efficacité.

- Il arrive que le préservatif glisse pendant le rapport
- Il arrive parfois que le préservatif se déplace sur le côté et pénétrer dans le vagin si l'on n'insère pas l'anneau interne assez profondément
- S'assurer que le préservatif reste en place pendant le rapport

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : En cas de lésions, plaies ouvertes ou lésions virales visibles chez l'un des partenaires, EVITER TOUTE PÉNÉTRATION SEXUELLE ET CONSULTER UN MÉDECIN.

ATTENTION : POUR UNE PROTECTION OPTIMALE, IL EST IMPORTANT DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSEILS D'UTILISATION

Comment utiliser le préservatif féminin ORMELLE

On utilise des préservatifs féminins dans le monde entier. Si on les utilise correctement, à chaque rapport sexuel, les préservatifs féminins réduisent les risques de grossesses indésirables et d'infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Utiliser un préservatif neuf à chaque rapport sexuel et respecter scrupuleusement le mode d'emploi ci-dessous.

- 1) Lavez soigneusement les mains et assurez-vous d'avoir les mains et les doigts secs et bien lavés. Evitez de toucher dans le coin supérieur droit. Enter tout contact avec les ongles, des bijoux, des ciseaux, les dents ou tout objet tranchant qui risquerait d'endommager le préservatif à l'ouverture. Retirez délicatement le préservatif féminin ORMELLE et l'examiner attentivement pour vérifier qu'il est en bon état.
- 2) L'anneau externe est plus grand que l'anneau interne. L'anneau externe recouvre la zone autour de l'ouverture du vagin. L'anneau interne sert à insérer le préservatif et à le maintenir en place au cours du rapport sexuel. Vérifier que l'anneau interne se trouve bien à l'intérieur des lèvres du vagin.
- 3) Pour l'insérer, l'un des partenaires maintient l'anneau interne entre le pouce et l'index, et forme un huit avec l'anneau, ou presse les bords l'un contre l'autre.
- 4) Choisir une position confortable – allongée, accroupie, ou sur le pied sur une chaise. Introduire doucement l'anneau dans le vagin.
- 5) Poussez l'anneau interne jusqu'au fond du vagin. Si nécessaire, s'aider de l'index. Une fois que le préservatif féminin ORMELLE est bien en place, l'anneau externe recouvre les grandes lèvres.
- 6) Guidez le pénis du partenaire à l'intérieur du préservatif ORMELLE. Veiller à ce que le pénis ne pénètre pas entre le préservatif et le paroi vaginale. Si l'on sent que le préservatif se déplace, s'arrêter et vérifier qu'il reste en place. L'homme doit se retirer peu après l'éjaculation en laissant le préservatif en place dans le vagin.
- 7) Retirer le préservatif féminin ORMELLE après utilisation en maintenant l'anneau externe et en tournant de façon à fermer l'ouverture et à empêcher les fluides, et à tirer doucement. Jeter le préservatif féminin ORMELLE après usage, car il est exclusivement à usage unique. Envelopper le préservatif soit dans un emballage, soit dans un mouchoir en papier et le jeter à la poubelle. Ne pas le jeter dans les toilettes.

READ THE INSTRUCTIONS GIVEN BELOW CAREFULLY BEFORE USING ORMELLE FEMALE CONDOM.

ORMELLE Female condoms are made from premium quality natural rubber latex and conform to ISO 25841 international standards and bear CE 2460 marking. ORMELLE female condoms are well lubricated. This product is manufactured using natural rubber latex which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user is allergic to latex. It is necessary to consult a doctor. ORMELLE female condoms are designed and manufactured to offer protection against pregnancy and sexually transmitted infections including HIV/AIDS. Initial use of ORMELLE female condom may require some practice and become easier with subsequent usage. Many couples seem to enjoy the insertion of female condom itself. There are many insertion positions. Do discover which one works best for you. Most couples suggest making the insertion part of foreplay, as it is easier. Some women find the inner ring more comfortable at the beginning, but if you experience discomfort, please check if it has been pushed inside far enough. ORMELLE female condom should be inserted into the vaginal before any contact between the vaginal and partner's body to assist in the prevention of sexually transmitted infections and pregnancies. Before you try to use ORMELLE female condom we advise you to read the instructions carefully and learn how to use correctly. We advise you not to use damaged and/or expired condoms. Check the expiry date before opening the sachet and look for any damages. Do not use the condoms after the expiration date printed on the package. Open the foil package and carefully remove the condom. Take care not to damage the condoms in any manner. If the individual sachet is damaged, discard the condom and use a new condom from the same pack. Never use a new condom every time you make sex. Seek medical advice as soon as possible, at least within 72 hours, in case of case of condom failure. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that may come in contact with the female condoms. Female condoms are strictly meant for single use only and that cleaning and reuse would compromise the effectiveness and integrity of the condom. Do not let condom come in contact with oil of any form (petroleum, jelly, baby oil, mineral oil, mustard oil, vegetable oil, massage oil, baby lotion, butter, etc.), as it may damage the condom. Do not use talcum powder or baby powder if any additional lubricant is desired, use only water based lubricants that compatible with condom. Do not use oil based lubricants. Avoid contact of condom with fingernails, jewelry, scissors, teeth or any sharp objects that may tear the condom. ORMELLE female condom is biodegradable. Dispose the condom in an environmental friendly manner. Dispose of the condom hygienically. Wrap it in a tissue and place it in the household waste. No barrier methods, including male or female condoms, provide 100% protection against pregnancy and sexually transmitted infections.

Keep vigilance to certain aspects that are specific to female condoms that can impair their effectiveness.

- It may happen that the condom slips during intercourse
- It may happen that the condom moves to the side and penetrates into the vagina if the inner ring is not inserted deeply enough as far as it can go
- Make sure the condom stays in place during sex
- Ensure that the condom remains in place during intercourse

PRECAUTIONS OF USE : In case of lesions, open sores, or viral lesions visible on either partner, DO NOT ENGAGE IN SEXUAL PENETRATION AND CONSULT YOUR DOCTOR.

ATTENTION : FOR MAXIMUM PROTECTION IT IS IMPORTANT TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

How to use ORMELLE female condom

Female condoms are used worldwide across the world. When used correctly, every time you have sex, female condoms reduce the risk of unintended pregnancies, sexually transmitted infections including HIV/AIDS. Use a new condom every time you have sex and follow the instruction below carefully.

- 1) Wash your hands well and open the sachet carefully by tearing the notch on the top right. Avoid contact with fingernail, jewelry, scissors, teeth or any sharp objects, while opening, as this may damage the condom. Take out carefully ORMELLE female condom and view it closely to make sure it is in good condition.
- 2) The outer ring is larger than the smaller ring. The outer ring covers the area around the opening of the vagina. The inner ring is used for insertion and to hold the sheath in place during intercourse. Be sure inner ring is at the close end of the pouch.
- 3) To insert, you or your partner, should hold the inner ring between the thumb and the forefinger. Form a figure of eight with the inner or squeeze the sides of the inner ring together.
- 4) Choose a position that is comfortable for insertion – squat, raise one leg, sit or lie down. Gently push the inner ring into the vagina.
- 5) Push the inner ring to the bottom of the vagina as far as it will go. Use forefinger to feel the inner ring. When ORMELLE female condom is inserted correctly, the outer ring will cover the outer lips of the vagina.
- 6) Guide your partner's penis into the ORMELLE female condom. Be sure that the penis is not entering from the sides between the sheath and the vagina wall. Stop and check if you feel the female condom is slipping into or out of the vagina. Withdraw the penis soon after ejaculation leaving the female condom in place in the vagina.
- 7) Remove the ORMELLE female condom after use, hold the outer ring, twist to seal in the fluid and pull it out gently. Discard the ORMELLE female condom after use, as it is meant for single use only. Wrap the condom either in the tissue or sachet and throw it in dustbin. Do not flush it.

BITTE VOR DER BENUTZUNG DER FRAUENKONDOME ORMELLE DIESE ANLEITUNGS SORGFÄLTIG LESEN.

Die ORMELLE-Kondome für Frauen sind aus hochwertigem, natürlichem Kautschuk hergestellt, erfüllen die internationale Norm ISO 25841 und tragen das EG-Label CE 2460. Die Frauenkondome ORMELLE sind mit Gleitmittel versehen. Dieses Produkt enthält Latex aus natürlichem Kautschuk, der allergische Reaktionen verursachen kann, darunter anaphylaktische Schock, falls der Benutzer allergisch ist. In diesem Fall muss ein Arzt herangezogen werden. Die Frauenkondome ORMELLE erhöhen das Gefühlsverleben beim Geschlechtsverkehr und schützen gleichzeitig vor unerwünschten Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten. Bei richtiger Anwendung verhindert das Frauenkondom ORMELLE eine Schwangerschaft und schützt vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie auch HIV/AIDS. Beim ersten Gebrauch kann das Einsetzen des Frauenkondoms etwas ungewohnt sein, was aber mit der Übung immer leichter wird. Zahlreiche Paare genießen das Einführen des Frauenkondoms und bauen es in ihr Vorspiel ein. Da viele Einführungspositionen möglich sind, sollten Sie einfach ausprobieren, was Ihnen am besten gefällt. Auf diese Weise wird das Einführen des Kondoms Teil des Liebespiels. Einige Frauen empfinden den inneren Ring zu Beginn als etwas unbequem, prüfen Sie bitte, ob Sie den inneren Ring tief genug eingeschoben haben. Das Frauenkondom ORMELLE sollte in die Vagina eingeführt werden, bevor es zu einem Geschlechtskontakt zwischen der Vagina und dem Penis des Partners kommt, um Geschlechtskrankheiten oder eine Schwangerschaft vorzubeugen. Vor der ersten Verwendung des ORMELLE-Frauenkondoms sollten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen und probieren, wie das Kondom richtig eingeführt wird. Niemals beschädigte oder abgelaufene Kondome verwenden. Kontrollieren Sie das Verfallsdatum vor dem Öffnen der Hülle und stellen Sie sicher, dass das Kondom nicht beschädigt ist. Nach dem auf der Packung aufgedruckten Ablaufdatum dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Öffnen Sie die Hülle und entnehmen Sie das Kondom vorsichtig. Dabei darauf achten, dass das Kondom nicht beschädigt wird. Weist eine Hülle eine Beschädigung auf, das Kondom wegwerfen und ein neues Kondom aus einer neuen Packung entnehmen. Niemals das gleiche Kondom ein zweites Mal verwenden. Für jeden Geschlechtsverkehr ein neues Kondom nehmen. Sollte ein Kondom gerissen sein, suchen Sie bitte innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneimitteln. Das Frauenkondom darf nur einmal benutzt werden; bei Reinigung und Wiederverwendung ist die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Kondom darf nicht mit fetten und Ölen in Kontakt kommen (das gilt für alle Öle wie Petroleum, Gelée, Babyöl, Mineralöl, Senföl, pfandföliche Öle, Massageöl, Körperkation, Butter usw.), da diese das Kondom beschädigen. Ebenfalls können Talc- oder Baby puder verwenden, da diese Öl enthalten könnte. Soll ein zusätzliches Gleitmittel verwendet werden, nehmen Sie bitte nur wasserbasierte Gleitmittel, die sich nicht innerhalb von 72 Stunden ärztlichen Rat. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker in Bezug auf die Verträglichkeit des Frauenkondoms mit örtlich angewendeten Arzneim