



Notice d'utilisation. Lire attentivement les instructions d'utilisation et les précautions d'emploi figurant sur la notice avant utilisation.



CYS-CONTROL® ULTRA

INFECTIONS URINAIRES / CYSTITES

UTILISATION PRÉVUE

CYS-CONTROL® ULTRA est destiné au contrôle et à la prévention des infections des voies urinaires (cystites) produites par des pathogènes tels que *E. coli* et d'autres bactéries Gram (-) généralement impliquées dans le développement des infections urinaires.

CYS-CONTROL® ULTRA est une formule perfectionnée à base de xyloglucane (hémicellulose) et de gélose, qui agit mécaniquement sur la paroi intestinale, en empêchant le contact des pathogènes avec la muqueuse intestinale, ce qui constitue la première étape de leur prolifération et de leur passage ultérieur vers les voies urinaires.

CYS-CONTROL® ULTRA est à prendre par voie orale, dès l'apparition des premiers symptômes de gênes urinaires, dans le but de réduire la prolifération des pathogènes susceptibles de se transformer en infections. En cas de récurrence de l'infection, CYS-CONTROL® ULTRA est également destiné à la prévention de nouveaux épisodes dans lesquels la prolifération des pathogènes provoque une nouvelle infection des voies urinaires.

PRÉSENTATION

Plaquette contenant 15 gélules.

COMPOSITION

Chaque gélule contient : 100 mg de xyloglucane, 50 mg de gélose, 100 mg de propolis, 100 mg d'*Hibiscus sabdariffa*, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium (origine végétale) et amidon de maïs.

MODE D'EMPLOI

Avaler la gélule avec un grand verre d'eau.

POSOLOGIE

Chez les patients qui présentent les premiers symptômes de gênes urinaires, CYS-CONTROL® ULTRA doit être pris par voie orale à raison de 2 gélules par jour (1 gélule toutes les 12 heures) pendant 5 jours. Pour la prévention des récurrences, 1 gélule par jour doit être prise pendant au moins 15 jours consécutifs par mois. Si nécessaire, le traitement peut être répété. Ce dispositif médical est destiné à être utilisé chez l'adulte.

MISES EN GARDE

- Le diagnostic d'infection des voies urinaires (IVU) doit être effectué par un médecin. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin.
- Une infection urinaire aiguë peut nécessiter un traitement antibiotique. Ce produit n'a pas de propriétés bactéricides ou bactériostatiques et ne peut donc pas se substituer à un traitement antibiotique. Cependant, CYS-CONTROL® ULTRA peut être administré de manière concomitante.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf en cas d'indication contraire par un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser le produit si la plaquette est ouverte ou endommagée.
- Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C. Ne pas congeler.
- Garder le produit hors de portée des enfants.

CONTRE-INDICATIONS

CYS-CONTROL® ULTRA ne doit pas être utilisé chez les patients souffrant d'hypersensibilité connue au xyloglucane, à la gélose ou à l'un des autres composants du produit.

CYS-CONTROL® ULTRA contient des ingrédients d'origine naturelle et est :



L'utilisation pendant la grossesse doit se faire sous la supervision d'un professionnel de santé



L'utilisation pendant l'allaitement doit se faire sous la supervision d'un professionnel de santé



NOVENTURE, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 BARCELONA
ESPAÑA



DISTRIBUTEUR

LABORATOIRES ARKOPHARMA
1^{re} Avenue 2709 M - LID de Carros Le Broc
06510 CARROS - FRANCE
Tel +33 (0)4 93 29 11 28 - www.arkopharma.com