

# LES SOLUTIONS URGO MEDICAL

## POUR UNE BONNE DÉLIVRANCE DES PRESCRIPTIONS




**NON SUBSTITUABLES<sup>1</sup>**  
**100% remboursables**

**UrgoStart<sup>plus</sup>**



Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation.

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Border




| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 8 x 8 cm   | 16    | 552719           | 35468.900.399.7.5 |
| 10 x 12 cm | 16    | 603025           | 35468.900.425.6.2 |
| 13 x 15 cm | 16    | 603014           | 35468.900.425.2.4 |
| 17 x 20 cm | 16    | 603016           | 35468.900.425.5.5 |
| 20 x 20 cm | 16    | 602891           | 35468.900.419.4.7 |

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Absorb




| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 6 x 6 cm   | 16    | 604185           | 35468.900.472.0.8 |
| 10 x 10 cm | 16    | 604190           | 35468.900.472.1.5 |
| 13 x 12 cm | 16    | 604193           | 35468.900.472.2.2 |
| 15 x 20 cm | 16    | 754305           | 35468.900.413.4.3 |

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Compresse



| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 6 x 6 cm   | 16    | 754183           | 35468.900.401.9.3 |
| 13 x 12 cm | 16    | 754193           | 35468.900.402.8.5 |
| 15 x 20 cm | 16    | 754202           | 35468.900.402.6.1 |

**UrgoStart**  
Interface



| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 5 x 7 cm   | 16    | 754124           | 35468.900.326.6.2 |
| 13 x 12 cm | 16    | 754150           | 35468.900.385.7.2 |
| 15 x 20 cm | 16    | 754160           | 35468.900.385.6.5 |

**NOUVEAUX FORMATS**


Recommandé par



**UrgoTul**



Brûlures du 2nd degré, dermabrasions, plaies traumatiques et post-opératoires, épidermolyse bulleuse.



| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 5 x 5 cm   | 10    | 508537           | NC                |
| 10 x 10 cm | 10    | 508538           | NC                |
| 10 x 12 cm | 16    | NC               | 34010.971.728.3.5 |
| 15 x 20 cm | 10    | 508512           | 34010.755.472.4.2 |
| 10 x 40 cm | 10    | 508541           | 34010.776.095.5.9 |
| 20 x 30 cm | 5     | 551910           | NC                |

**UrgoFit**



**NOUVEAUTÉ**

Disponible à partir de janvier 2026

Plaies post-opératoires, brûlures, plaies traumatiques, Épidermolyse Bulleuse, greffes.



| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 5 x 5 cm   | 10    | 603710           | NC                |
| 12 x 12 cm | 16    | 602662           | 35468.900.408.3.4 |
| 12 x 40 cm | 10    | 602663           | 35468.900.408.5.8 |
| 15 x 22 cm | 10    | 602664           | 35468.900.408.7.2 |

**UrgoClean**



**UrgoClean**  
Meche\*

Plaies exsudatives, plaies cavitaires et anfractueuses, plaies chroniques, plaies aiguës, plaies post-opératoires, plaies oncologiques.



| Taille      | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|-------------|-------|------------------|-------------------|
| 5 x 40 cm   | 16    | 506437           | 34010.413.696.6.3 |
| 2.5 x 40 cm | 5     | 603210           | NC                |

\* Non disponible dans les DOM TOM

**GAMME ARGENT**



Traitement local des plaies à risque ou avec des signes d'infection locale.

**UrgoTul Ag**



| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 10 x 12 cm | 16    | 507634           | 34010.958.438.5.0 |
| 15 x 20 cm | 16    | 507628           | 34010.958.437.9.9 |

**UrgoClean Ag**



| Taille     | Boîte | Code Hospitalier | Code ville        |
|------------|-------|------------------|-------------------|
| 6 x 10 cm  | 16    | 552253           | 35468.900.000.0.5 |
| 13 x 12 cm | 16    | 552254           | 35468.900.000.2.9 |
| 15 x 20 cm | 16    | 552255           | 35468.900.000.1.2 |

**UrgoK2**

Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère veineux de jambe et/ou des oedèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée.

**UrgoK2**



**UrgoK2**  
Latex free

| Taille de cheville | Largueur de bandes | Code Hospitalier | Code Ville        |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 18-25 cm           | 8 cm               | 604195           | 35468.900.377.6.6 |
| 18-25 cm           | 10 cm              | 604196           | 35468.900.472.4.6 |
| 18-25 cm           | 12 cm              | 552921           | 34010.206.445.8.3 |
| 25-32 cm           | 8 cm               | 604198           | 35468.900.377.7.3 |
| 25-32 cm           | 10 cm              | 604199           | 35468.900.378.0.3 |
| 25-32 cm           | 12 cm              | 604200           | 35468.900.377.9.7 |
| 18-25 cm           | 10 cm              | 604192           | 35468.900.294.9.5 |
| 25-32 cm           | 10 cm              | 604194           | 35468.900.294.8.8 |

Conforme aux recommandations de la HAS en 1<sup>ère</sup> intention et jusqu'à cicatrisation complète.\*

Pour les DROM-COM, seul **URGOK2 Latex Free** est disponible.

\*Hors UrgoK2 Latexfree

**URGO**  
MEDICAL  
Healing people®

\* TLC-NOSF : Technologie Lipido-Colloïde - Nano OligoSaccharide Factor (KSOS : Sel de Sucrose Octasulfate de Potassium).\*\* Fibres polyabsorbantes

- (1)Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant.  
(2)Hors UrgoK2 Latexfree  
(3) Amélioration du Service Attendu III : dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique, d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA / IWGDF) en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).  
(4) Amélioration du Service Attendu (ASA IV) : dans l'indication des ulcères de jambe veineux ou mixtes à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).  
(5) Dans le traitement de la plaie du pied diabétique. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2023.  
(6) Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM, Martini J, Petit JM, Rayman G, Lobmann R,Ucciolli L, Sauvadet A,Bohbot S, KerihuelJC, Piaggese. A. Sucrose octasulfatedressing versus control dressing in patients with neuroischaemicdiabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;6 (3):186-196.  
(7) Dans l'ulcère de jambe et la plaie du pied diabétique. https://www.nice.org.uk/guidance/mtg42, janvier 2019.  
(8) Sultan A, Bihan H, Bouillet B, et al., pour la Société francophone du Diabète(SFD). Référentiel pied diabétique SFD 2024. Med Mal Metab 2024; 18: 174-1  
(9) Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS décembre 2010. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr

**UrgoTul** : Pansement interface souple avec matrice TLC. Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %) dans le traitement des plaies aiguës, chroniques et d'épidermolyse bulleuse congénitale. Avis de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site https://www.has-sante.fr.  
Contre-indications : plaies de muqueuses, hypersensibilité connue du patient à l'un des pansements avec matrice TLC, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). La fréquence de renouvellement est laissée à l'appréciation du professionnel de santé. Cependant, il est recommandé de renouveler UrgoTul tous les 1 à 4 jours et d'adapter la fréquence de renouvellement selon l'état clinique de la plaie et la quantité des exsudats (c'est-à-dire la quantité des fluides au niveau de la plaie) sans dépasser 7 jours d'application par pansement. Renouvellement tous les 1 à 3 jours pour l'épidermolyse bulleuse.  
Lire attentivement la notice avant utilisation.

**UrgoClean Ag**: Pansement antimicrobien avec fibres poly-absorbantes et matrice TLC-Ag. Dispositif Médical de classe III (BSI CE 2797).  
Indications : Plaies exsudatives chroniques et aiguës à risque ou avec signes d'infection locale.  
Contre-indications : Plaies de muqueuses; Hypersensibilité connue à l'argent, à la carboxyméthylcellulose (CMC), ou à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-Ag; Ne pas utiliser le pansement chez des patients devant passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).  
Renouvellement tous les 1 à 2 jours puis espacement possible. Lire attentivement la notice avant utilisation.  
Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement séquentiel de 4 semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : Douleur entre deux changements de pansements, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Classe LPPR des « Pansements à l'Argent ». Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site https://www.has-sante.fr/.

**UrgoTul Ag**: Pansement interface souple avec matrice TLC-Ag. Dispositif Médical de classe III (BSI CE 2797).  
Indications : Plaies aiguës et chroniques à risque ou avec signes d'infection locale.  
Contre-indications : Plaies de muqueuses; Hypersensibilité connue à l'argent, à la carboxyméthylcellulose (CMC), ou à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-Ag; Ne pas utiliser le pansement chez des patients devant passerun examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).Renouvellement tous les 1 à 3 jours.  
Lire attentivement la notice du produit avant utilisation.  
Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement séquentiel de 4 semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Classe LPPR des « Pansements à l'Argent ». Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site https://www.has-sante.fr/.

**UrgoStart Plus Border / UrgoStart Plus Compresse / UrgoStart Plus Absorb** : Traitement pour réduire le temps de cicatrisation. Dispositifs Médicaux de classe IIb, (BSI CE 2797).  
Indications : Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation.  
Contre-indications : plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC).Renouvellement tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion de la plaie, puis adapter la fréquence de renouvellement en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. Intégralement remboursable LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice avant utilisation. Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site https://www.has-sante.fr/.

**UrgoClean Meche** : Mèche absorbante à base de fibres poly-absorbantes et stilet d'application.Dispositif médical de classe IIb (G-Med 0459 ou BSI CE 2797).  
Indications : Traitement des plaies cavitaires exsudatives et autres plaies creuses exsudatives qui ont besoin d'être comblées avec une mèche absorbante.  
Contre-Indications : Fistules. sinus ou plaies tunnelisées plus étroit(e)s que le diamètre du stilet d'application. Plaies de profondeur indéterminée où dans lesquelles une solution d'irrigation ne peut être récupérée. Plaies hémorragiques. Le pansement ne doit pas être utilisée comme éponge chirurgicale. Plaies chirurgicales destinées à être fermées en première intention. Hypersensibilité connue du patient à ce pansement.  
Renouvellement tous les 1 à 2 jours. Lire attentivement la notice avant utilisation.Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans la prise en charge des plaies chroniques très exsudatives en phase de détersion.

**UrgoStart Interface** : Pansement interface lipido-colloïde souple. Traitement pour réduire le temps de cicatrisation.Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797).  
Indications : Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation. Convient pour le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles, ainsi que pour les peaux péri-lésionnelles fragilisées, ou de localisations difficiles et méchage des plaies creuses. Peau péri-lésionnelle fragilisée.  
Contre-indications : plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC).  
Renouvellement tous les 2 à 4 jours. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel) , et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice du produit avant utilisation.Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur lesite https://www.has-sante.fr/.

**UrgoK2 / UrgoK2 Latex free** : Systèmes de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée.  
Dispositifs Médicaux de classe I. Marqués CE  
Indications : Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère veineux de jambe et/ou des oedèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée.  
Contre-Indications :  
- Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec notamment un Indice de Pression Systolique (IPS) récent <0.8.  
- Patient souffrant de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique.  
- Oedème causé par une insuffisance cardiaque congestive.  
- Pontage artériel extra-anatomique.  
- Hypersensibilité connue à l'un des constituants - en particulier le latex pour URGO K2.  
Lire attentivement la notice des produits avant utilisation. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS ≥ à 0.8) - Avis CNEDIMTS disponible sur le site https://www.has-sante.fr/.

**UrgoFit** : Pansement interface souple et conformable composé d'une matrice TLC. Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %) dans le traitement des plaies aiguës, chroniques et d'épidermolyse bulleuse congénitale. Avis de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site https://www.has-sante.fr/.  
Contre-indications : plaies de muqueuses, hypersensibilité connue du patient à l'un des pansements avec matrice TLC, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC).  
Lire attentivement la notice avant utilisation.

