


HÉPATITE C

POURQUOI TRAITER ?

Du dépistage au traitement,
encouragez vos patients.



FOIE & GÉNÉRALITÉS

MALADIES
HÉPATIQUES



GILEAD

Les défis sont sans répit.
Notre engagement aussi.




POURQUOI TRAITER ?

Parce que c'est une maladie
dont **ON GUÉRIT** ^(1,2,5)


C'est une maladie fréquente en France...



nouvelles
contaminations par an ⁽⁵⁾



...et potentiellement grave



En France, l'hépatite C
est responsable de
2 600 décès par an ⁽⁵⁾

Fiches
d'information
détachables sur
l'HÉPATITE C



emplacement
bloc de fiches
patient

POUQUOI SE FAIRE DEPISTER ET SE FAIRE TRAITER ?



Parce que c'est une maladie dont **ON GUÉRIT** ^(1, 2, 5)

Il existe aujourd'hui des **traitements qui peuvent éliminer le virus de l'hépatite C**, avec une bonne efficacité, bien tolérés, et à prendre pendant quelques semaines. ^(1,2)

Traiter son hépatite C peut permettre :

- de guérir et de préserver sa qualité de vie ⁽⁸⁾,
- de ralentir et arrêter la progression de la fibrose et même permettre sa régression ⁽⁵⁾,
- d'éviter le risque de transmission du virus à autrui ⁽⁸⁾.



La guérison ne protège pas d'une re-contamination : même après guérison, une nouvelle infection par le VHC est possible car les anticorps ne permettent pas d'être immunisés. ^(2,5,8,11,12)

L'hépatite C est une maladie transmissible ⁽⁵⁾

Cette maladie est due au virus de l'hépatite C. Elle se transmet par contact avec le sang d'une personne infectée, par contact direct ou par l'intermédiaire d'un objet contaminé ⁽⁵⁾.



Une maladie à l'évolution souvent silencieuse, mais potentiellement grave ⁽⁵⁾



En France, 50% des personnes infectées ne le savent pas ⁽¹⁾


car l'hépatite C ne donne pas toujours de symptômes : c'est une maladie dite "silencieuse". ⁽⁵⁾

Le virus de l'hépatite C peut endommager **le foie.** ⁽⁵⁾




Après l'infection, le corps peut éliminer le virus tout seul.

Mais souvent la maladie évolue vers **une hépatite C chronique.** ⁽⁵⁾



EN CAS DE DOUTE, IL EST DONC ESSENTIEL DE SE FAIRE DÉPISTER.



Le dépistage de l'hépatite C est **essentiel, simple et rapide** et peut se faire de plusieurs façons ^(1,2,6,8-10)

	 Analyse de sang	 TROD	 Papier buvard
Qu'est-ce que c'est ?	Prise de sang	Salive ou goutte de sang prélevée au bout du doigt • Pas de prise de sang	Goutte de sang prélevée au bout du doigt • Pas de prise de sang
Dois-je prendre RDV chez mon médecin ?	Si vous le souhaitez	NON	NON
Où puis-je le faire ?	• Laboratoire d'analyses sur prescription médicale • CeGIDD sans ordonnance	• CeGIDD • CSAPA • CAARUD • PASS • Associations	• CSAPA • CAARUD • Associations
Quand aurai-je le résultat ?	En quelques jours	En 30 minutes	De 3-4 jours à 2 semaines
Dois-je payer ?	• Remboursé à 100 % si prescrit par un médecin • NON en CeGIDD	NON	NON

CAARUD : Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues - CeGIDD : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic - CSAPA : Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie - PASS : Permanence d'accès aux soins de santé - TROD : Test rapide d'orientation diagnostique



LE DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE C EST RECOMMANDÉ AU MOINS UNE FOIS DANS SA VIE. ⁽²⁾

Informations

Cachet du médecin



Le dépistage de chaque adulte au moins une fois dans sa vie est recommandé. ⁽²⁾

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour effectuer le dépistage : ^(1,2,6,8-10)

■ Prise de sang

Ce test est **remboursé à 100% par la Sécurité sociale** sur prescription médicale. Il est possible de faire **un dépistage gratuit et anonyme** (sans ordonnance) dans un CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic). Ce test permet de dépister des anticorps témoins d'un contact avec le VHC (anticorps anti-VHC).

Test de référence



■ TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique)

Ce test peut être réalisé au sein d'associations et dans certaines structures de soins. De **la salive ou une goutte de sang** est prélevée au bout du doigt. Le TROD permet la détection des anticorps anti-VHC.

Test SIMPLE et RAPIDE : Sans prise de sang, résultats en moins de 30 minutes.




■ Papier buvard

Ce test peut être réalisé au sein d'associations et dans certaines structures de soins. Il s'agit de prélever **une goutte de sang après une piqûre au bout du doigt** (ou au talon), puis de l'apposer sur un papier buvard. Il permet la détection des anticorps anti-VHC et la quantification de l'ARN du VHC.


Test SIMPLE : Sans prise de sang.



Lorsqu'une sérologie virale, un TROD ou un papier buvard est positif, une charge virale du VHC doit être prescrite.



*PCR : Réaction en chaîne par polymérase.





BIBLIOGRAPHIE

1. Dhumeaux D, *et al.* Prise en charge thérapeutique et suivi de l'ensemble des personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Recommandations du groupe d'experts et sous l'égide de l'ANRS et du CNS avec le concours de l'AFEF. Paris : Ed. EDP sciences. Rapport 2016.
2. AFEF. Recommandations AFEF pour l'élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C en France. Mars 2018.
3. Santé Publique France. Pioche C, *et al.* Estimation de la prévalence de l'hépatite C en population générale. France métropolitaine 2011. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 2016;13-14:224-30.
4. Savoir c guérir. Baromètre de l'éradication de l'hépatite C. Consulté le 12 juillet 2018 sur le site : www.savoir-c-guerir.com/barometre.
5. Dhumeaux D, *et al.* Prise en charge des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Recommandations du groupe d'expertset sous l'égide de l'ANRS et de l'AFEF. Paris : Ed. EDP sciences. Rapport 2014.
6. HAS. Place des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l'hépatite C. Recommandation en santé publique. Mai 2014.
7. Deuffic-Burban S, *et al.* Assessing the cost-effectiveness of hepatitis C screening strategies in France. Journal of Hepatology 2018. Article in press.
8. Hépatite C : Du dépistage au traitement - Questions et réponses à l'usage des patients (2007). Consulté le 26.06.2018 sur le site de l'INPES : <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1055.pdf>.
9. INPES. Se faire dépister. C'est se donner des chances de guérir. Consulté le 26.06.2018 sur le site de l'INPES : <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1290.pdf>.
10. Chevaliez S, Pawlotsky JM. Méthodes alternatives au prélèvement sanguin pour le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite C. BEHWeb 2011. Consulté le 26.06.2018 sur le site INVS : www.invs.sante.fr/behweb/2011/01/r-4.htm.
11. INPES. Hépatite C. Dépistage, clinique, prise en charge et conseils aux patients - Document à l'usage des médecins. Consulté le 27/07/2018 sur le site de l'INPES : <http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1054.pdf>.
12. AIDES. Les bases pour comprendre l'hépatite C. Octobre 2008.