

INDICATION : DERMATITE ATOPIQUE		Prescription réservée aux spécialistes en dermatologie, médecine interne, pédiatrie ou allergologie	
Tranches d'âges		Dose initiale	Doses suivantes
Adultes		600 mg (deux injections de 300 mg)	300 mg toutes les deux semaines
Adolescents âgés de 12 à 17 ans	< 60 kg	400 mg (deux injections de 200 mg)	200 mg toutes les deux semaines
	≥ 60 kg	600 mg (deux injections de 300 mg)	300 mg toutes les deux semaines
Enfants âgés de 6 à 11 ans	15 kg à < 60 kg	300 mg (une injection de 300 mg) au jour 1, puis 300 mg au jour 15	300 mg toutes les 4 semaines <span style="color: green;">■</span> à partir de 4 semaines après la dose du jour J15
	≥ 60 kg	600 mg (deux injections de 300 mg)	300 mg toutes les 2 semaines
Enfants âgés de 6 mois à 5 ans	5 kg à < 15 kg	200 mg (une injection de 200 mg)	200 mg toutes les 4 semaines
	15 kg à < 30 kg	300 mg (une injection de 300 mg)	300 mg toutes les 4 semaines
INDICATION : ASTHME		Prescription réservée aux spécialistes en pneumologie, médecine interne, pédiatrie ou allergologie	
1 - Asthme sévère traité par des corticostéroïdes oraux ou pour l'asthme sévère associé à une dermatite atopique modérée à sévère ou associé à une polypose naso-sinusienne sévère			
Tranches d'âges		Dose initiale	Doses suivantes
Adultes		600 mg (soit 2 injections de 300 mg)	300 mg administrée toutes les deux semaines
Enfants âgés de 6 à 11 ans		Voir indication Dermatite Atopique	
2 - Asthme sévère			
Tranches d'âges		Dose initiale	Doses suivantes
Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus		400 mg (soit 2 injections de 200 mg)	200 mg administrée toutes les deux semaines
Enfants âgés de 6 à 11 ans	<b>Doses initiales et doses suivantes</b>		
	15 kg à < 30 kg	300 mg toutes les quatre semaines	
	30 kg à < 60 kg	200 mg toutes les deux semaines	
		ou 300 mg toutes les quatre semaines	
≥ 60 kg	200 mg toutes les deux semaines		
INDICATION : POLYPOSE NASO-SINUSIENNE		Prescription réservée aux spécialistes en oto-rhino-laryngologie ou en allergologie	
Tranches d'âges		Dose initiale	Doses suivantes
Adulte		300 mg (une injection de 300 mg)	300 mg toutes les deux semaines
INDICATION : PRURIGO NODULAIRE		Prescription réservée aux spécialistes en dermatologie, allergologie ou médecine interne	
Tranches d'âges		Dose initiale	Doses suivantes
Adulte		600 mg (deux injections de 300 mg)	300 mg toutes les deux semaines
INDICATION : CÉSOPHAGITE A EOSINOPHILES		Prescription réservée aux spécialistes en allergologie, hépato-gastro-entérologie, pédiatrie ou médecine interne	
Tranches d'âges		Doses initiales et suivantes	
Adulte et adolescent âgé de 12 ans et plus		300 mg toutes les semaines	

■ la dose peut être augmentée à 200 mg 1x/2 semaines chez les patients ayant un poids corporel de 15 kg à moins de 60 kg en fonction de l'évaluation du médecin.