

Secnol[®] 2g granulés en sachet-dose, Secnidazole

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?
3. Comment prendre SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Classe pharmacothérapeutique - code ATC : ANTIPROTOZOAIRE de la famille des nitro-5-imidazolés.
Ce médicament contient du secnidazole. Il est indiqué dans le traitement de :

- urétrites et vaginites à *Trichomonas vaginalis*, vaginoses bactériennes,
- amibiase intestinale et amibiase hépatique,
- giardiase.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?

Ne prenez jamais SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose :

- si vous êtes allergique à la substance active, ou à la famille des imidazolés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Avant d'utiliser SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose, prévenez votre médecin si vous présentez des troubles sanguins.

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose :

Il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et soudaine (oedème de Quincke), se manifestant par un brusque gonflement du visage et du cou (voir section 4. «QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?»). Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose.

Autres médicaments et SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Prévenez en particulier votre médecin si vous prenez des médicaments contenant de l'alcool en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose avec de l'alcool

Eviter la prise de boissons alcoolisées durant ce traitement en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier trimestre de la grossesse. Au-delà du premier trimestre, l'utilisation de ce médicament est envisageable.

Il est préférable d'éviter l'administration de ce médicament pendant l'allaitement ou de suspendre l'allaitement pendant 24 heures en cas de prise unique de ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges attachés à l'emploi de ce médicament.

SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose contient du saccharose

Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament : l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est :

urétrites et vaginites, vaginoses bactériennes :

- adultes : 1 sachet de 2 g, en une prise unique ; dose à prendre un seul jour.

amibiase intestinale :

- amibiase aiguë symptomatique :
 - adultes : 1 sachet de 2 g, en une prise unique ; dose à prendre un seul jour.
 - enfants : 30 mg/kg/j, en une prise unique ; dose à prendre un seul jour.
- amibiase asymptomatique: même dose quotidienne, pendant 3 jours.

amibiase hépatique :

- adultes : 1,5 g par jour, en une ou plusieurs prises, pendant 5 jours.
- enfants : 30 mg/kg/j, en une ou plusieurs prises, pendant 5 jours.

giardiase :

- enfants : 30 mg/kg/j, en une prise unique ; dose à prendre un seul jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale


Ce médicament est à prendre au début du repas.

Les granulés peuvent être :

- versés directement sur la langue puis avalés sans être croqués, avec une gorgée de liquide ; ou
- mélangés à des aliments semi-solides (purée, confiture, yaourt...) puis avalés sans être croqués.

NE PAS CROQUER LES GRANULÉS.

NE PAS DILUER ce médicament dans de l'eau ou tout autre liquide avant administration.



Durée de traitement

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Si vous avez pris plus de SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose que vous n'auriez dû

La prise d'une quantité excessive de ce médicament peut entraîner des troubles neurologiques. Consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables fréquents (entre 1 et 10 personnes sur 100 peuvent présenter les effets suivants) :

- Nausées, vomissements, douleurs au niveau de l'estomac, goût métallique dans la bouche, inflammation de la langue, inflammation de la cavité buccale.

Effets indésirables rares (entre 1 et 10 personnes sur 10 000 peuvent présenter les effets suivants) :

- Maux de tête, vertiges, difficulté à coordonner des mouvements, sensations de picotements et de fourmillements, atteintes de certains nerfs avec des troubles sensitifs et moteurs.
- Réaction d'allergie immédiate (fièvre, rougeur, urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre d'ortie), angio-oedème (brusque gonflement du visage et du cou)).

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Taux anormalement bas de globules blancs dans le sang (réversible à l'arrêt du traitement).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose

- La substance active est :

Secnidazole 2,000 g

Pour un sachet.

- Les autres composants sont :
Microgranules neutres*, polyvidone, polyéthylèneglycol 4000, polymères d'esters d'acide méthacrylique (Eudragit NE30D), talc, silice colloïdale anhydre (Aérosil 200).

*Composition des microgranules neutres : saccharose - amidon.

Qu'est-ce que SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de granulés. Boîte de 1 ou 3 sachets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MEDIPHA SANTE

19 AVENUE DE NORVEGE, LES FJORDS, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

MEDIPHA SANTE

LES FJORDS – IMMEUBLE OSLO, 19 AVENUE DE NORVEGE, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Fabricant

ATHENA IPS

ZONE INDUSTRIELLE N 2, 1 RUE NUNGESSER, 59121 PROUVY

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Mars 2026.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



Séparez les éléments avant de trier

Secno[®] 2g granules in sachet, Secnidazole

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You might need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

1. What SECNOL 2 g, granules in sachet are and what they are used for
2. What you need to know before you take SECNOL 2 g, granules in sachet
3. How to take SECNOL 2 g, granules in sachet
4. Possible side effects
5. How to store SECNOL 2 g, granules in sachet
6. Contents of the pack and other information

1. WHAT SECNOL 2 g, granules in sachet ARE AND WHAT THEY ARE USED FOR
Pharmacotherapeutic group - ATC code: ANTIPROTOZOAL belonging to the family of 5-nitro-imidazoles.

This medicine contains secnidazole. It is indicated in the treatment of:

- urethritis and vaginitis caused by *Trichomonas vaginalis*, bacterial vaginosis,
- intestinal amoebiasis and hepatic amoebiasis,
- giardiasis.

You must talk to your doctor if you do not feel better or if you feel worse.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE SECNOL 2 g, granules in sachet

Do not take SECNOL 2 g, granules in sachet:

- if you are allergie to the active substance, to the imidazole family, or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Warnings and precautions

If your doctor has told you that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

Before using SECNOL 2 g, granules in sachet, tell your doctor if you have any blood disorders.

Tell your doctor immediately if any of the following disorders occurs during treatment with SECNOL 2 g, granules in sachet.

A risk of an allergie reaction of severe and sudden onset (Quincke’s oedema), manifested by sudden swelling of the face and neck (see section 4. «POSSIBLE SIDE EFFECTS»).

If these symptoms occur, stop taking this medicine and contact your doctor immediately.

Talk to your doctor or pharmacist before taking SECNOL 2 g, granules in sachet.

Other medicines and SECNOL 2 g, granules in sachet

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

In particular tell your doctor if you are taking medicines containing alcohol because of the risk of reactions such as facial redness, heat, vomiting and quickening heartbeat.

SECNOL 2 g, granules in sachet with alcohol

Avoid drinking alcohol during this treatment because of the risk of reactions such as facial redness, heat, vomiting and quickening heartbeat.

Pregnancy and breast-feeding

This medicine should not be used during the first trimester of pregnancy.

Use of this medicine can be considered after the first trimester.

You should avoid taking this medicine while breast-feeding or should stop breast-feeding for 24 hours if taking a single dose of this medicine.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines

Drivers and machine users in particular should be warned about the risk of dizziness associated with the use of this medicine.

SECNOL 2 g, granules in sachet contains sucrose

If your doctor has told you that you have an intolerance to certain sugars, contact your doctor before taking this medicine: this medicine is not suitable for patients with fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption syndrome or sucrose/isomaltase deficiency (rare hereditary diseases).

3. HOW TO TAKE SECNOL 2 g, granules in sachet

Always take this medication exactly as your doctor or pharmacist has told you.

Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Dosage

The recommended dose is:

Urethritis and vaginitis, bacterial vaginosis:

- Adults: 1 x 2 g sachet, as a single dose; take for one day only.

Intestinal amoebiasis:

- Symptomatic acute amoebiasis:
 - Adults: 1 x 2 g, as a single dose; take for one day only.
 - Children: 30 mg/kg/day, as a single dose; for one day only.
- Asymptomatic amoebiasis: same daily dose, for 3 days.

Hepatic amoebiasis:

- Adults: 1.5 g per day, in one or more doses, for 5 days.
- Children: 30 mg/kg/day, in one or more doses, for 5 days.

Giardiasis:

- Children: 30 mg/kg/day, as a single dose; for one day only.

ALWAYS TAKE THIS MEDICINE AS YOUR DOCTOR HAS PRESCRIBED.

Method and route of administration

Oral route


This medicine should be taken at the beginning of the meal.

The granules can be:

- poured directly onto the tongue and then swallowed without chewing, with a drop of liquid; or
- mixed with semi-solid foods (purée, jam, yogurt...) and then swallowed without chewing.

DO NOT CHEW THE GRANULES.

DO NOT DISSOLVE this medicine in water or any other liquid before administration.



Duration of the treatment

To be effective, this medicine must be used regularly at the prescribed doses and for as long as your doctor advises.

The disappearance of fever or any other symptom does not mean that you are cured.

You may feel tired. This is net due to the antibiotic treatment but to the infection itself.

Reducing or stopping your treatment will have no effect on this feeling and will delay your recovery.

If you take more SECNOL 2 g, granules in sachet than you should

Excessive use of this medicine may cause neurological damage.

Consult your doctor.

If you forget to take SECNOL 2 g, granules in sachet

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist for more information.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Common side effects (between 1 and 10 in 100 people may experience the following side effects):

- Nausea, vomiting, stomach pain, metallic taste in the mouth, inflammation of the tongue, inflammation of the oral cavity.

Rare side effects (between 1 and 10 in 10,000 people may experience the following):

- Headache, dizziness, difficulty coordinating movements, prickling and tingling sensations, some nerves affected with sensory and motor disorders.
- Immediate allergy reaction [fever, redness, hives (rash similar to that caused by a stinging nettle), angioedema (sudden swelling of the face and neck)].

Frequency not known (cannot be estimated from the available data):

- Abnormally low level of white blood cells in the blood (reversible when treatment is stopped).

If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if some side effects become serious, please tell your doctor or pharmacist.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products) and the réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance (network of Regional Pharmacovigilance Centers) - website: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>
By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE SECNOL 2 g, granules in sachet

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box. The expiry date refers to the last day of that month.

No special precautions for storage.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist to dispose of medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

What SECNOL 2 g, granules in sachet contains

- The active substance is:

Secnidazole 2.000 g
For one sachet

- The other ingredients are:

Neutral microgranules*, polyvidone, polyethylene glycol 4000, polymers of methacrylic acid esters (Eudragit NE30D), talc, anhydrous colloidal silica (Aerosil 200).

*Composition of neutral microgranules: sucrose - starch.

What SECNOL 2 g, granules in sachet looks like and contents of the pack

This medication is in the form of granules. Box of 1 or 3 sachets.

Marketing Authorisation Holder / Exploitant

MEDIPHA SANTE

LES FJORDS – IMMEUBLE OSLO, 19 AVENUE DE NORVEGE, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Manufacturer

ATHENA IPS

ZONE INDUSTRIELLE N 2, 1 RUE NUNGESSER, 59121 PROUVY

This leaflet was last revised in: March 2026.

Detailed information on this medicine is available on the website of the ANSM (France).



Séparez les éléments avant de trier