



SEDINAX®



SUBSTANCE ACTIVE Extrait sec de valériane (*Valeriana officinalis L.*)

FORME Comprimé pelliculé

LABORATOIRE Laboratoire TILMAN
ZI Sud 15. 5377 Baillonville. Belgique
Site web : <http://www.tilman.fr>

CODE CIP	PRÉSENTATION	P. PHARM. H.T.	TVA	SÉC. SOC.
3400930196175	SEDINAX® 500 mg, boîte de 28 cp	6,29 €	10 %	NR
3400930196182	SEDINAX® 500 mg, boîte de 56 cp	10,00 €	10 %	NR

VENTES DIRECTES

TÉL Numéro vert : 0 800 00 20 27

@ contact@promogen.fr

POSOLOGIE

Adultes, adolescents de plus de 12 ans et personnes âgées :

- Pour le soulagement de(s) :
 - la tension nerveuse légère : 1 cp jusqu'à trois fois/j
 - troubles du sommeil : 1 cp, 30 min à 1h avant le coucher, précédé si nécessaire par la prise d'un cp au cours de la soirée

Dose journalière max. : 4 cp

Prise continue pendant 2 à 4 semaines

MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale : avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau

Ne pas mâcher les comprimés

INFORMATIONS PRATIQUES

Ne pas conduire de véhicules ou de machines

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES

INDICATIONS

■ **Adultes et adolescents de plus de 12 ans :**

- Médicament à base de plantes utilisé pour le soulagement de la tension nerveuse légère et des troubles du sommeil

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Si aggravation ou persistance des symptômes après 2 semaines d'utilisation continue, consulter un médecin ou un pharmacien
- **GROSSESSE / ALLAITEMENT :** l'utilisation de SEDINAX® n'est pas recommandée

EFFETS INDÉSIRABLES

- Possible survenue de manifestations gastro-intestinales (nausées, crampes abdominales...) de fréquence inconnue

INTERACTIONS

- **Co-administration avec des sédatifs synthétiques :** non recommandé (risque de fatigue, d'étourdissements et somnolence)

Cliquez ici pour voir la monographie

