

## SELEXID®



|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| MOLÉCULE    | Pivmécillinam                                      |
| FORME       | Comprimé pelliculé                                 |
| CLASSE ATC  | Pénicillines à large spectre (Code : J01CA08)      |
| LABORATOIRE | KARO Pharma AB<br>Box 16184 10324 Stockholm, Suède |

## INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

| PRÉSENTATION                                                  | CODE CIP      | LISTE | PRIX T.T.C. | SÉC. SOC.** |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|
| SELEXID® 200 mg, comprimés pelliculés, boîte de 12 comprimés* | 3400937993050 | I     | 4,74 €      | 65 %        |
| SELEXID® 200 mg, comprimés pelliculés, boîte de 20 comprimés  | 3400930104934 | I     | 7,86 €      | 65 %        |
| SELEXID® 200 mg, comprimés pelliculés, boîte de 28 comprimés  | 3400930104941 | I     | 10,97 €     | 65 %        |

\* Jusqu'à écoulement des stocks.

\*\* Dans l'indication « Traitement des infections urinaires communautaires uniquement en cas de cystite aiguë simple de la femme ».

## INFORMATIONS MÉDICALES

| INDICATIONS                                                                                                                                                                                                                            | SCHÉMA POSOLOGIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chez la femme adulte</b>, traitement des infections urinaires. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens</li> </ul> | <table> <tr> <th>Indications</th><th>Posologie</th></tr> <tr> <td>Cystites aiguës non compliquées</td><td>400 mg (2 cp) x 2/jour pendant 5 jours</td></tr> <tr> <td>Cystites à risque de complication, incluant les cystites gravidiques<br/>Bactériuries asymptomatiques gravidiques</td><td>400 mg (2 cp) x 2/jour pendant 7 jours</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Insuffisance rénale</b> : dose de charge identique puis réduire la posologie d'entretien, comme ci-dessous :</li> </ul> <table> <tr> <th>Filtration glomérulaire (FG)</th><th>Posologie d'entretien</th></tr> <tr> <td>15 ≤ FG ≤ 30 ml/min</td><td>diviser la posologie par 2</td></tr> <tr> <td>FG &lt; 15 ml/min</td><td>diviser la posologie par 3</td></tr> </table> | Indications | Posologie | Cystites aiguës non compliquées | 400 mg (2 cp) x 2/jour pendant 5 jours | Cystites à risque de complication, incluant les cystites gravidiques<br>Bactériuries asymptomatiques gravidiques | 400 mg (2 cp) x 2/jour pendant 7 jours | Filtration glomérulaire (FG) | Posologie d'entretien | 15 ≤ FG ≤ 30 ml/min | diviser la posologie par 2 | FG < 15 ml/min | diviser la posologie par 3 |
| Indications                                                                                                                                                                                                                            | Posologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |
| Cystites aiguës non compliquées                                                                                                                                                                                                        | 400 mg (2 cp) x 2/jour pendant 5 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |
| Cystites à risque de complication, incluant les cystites gravidiques<br>Bactériuries asymptomatiques gravidiques                                                                                                                       | 400 mg (2 cp) x 2/jour pendant 7 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |
| Filtration glomérulaire (FG)                                                                                                                                                                                                           | Posologie d'entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |
| 15 ≤ FG ≤ 30 ml/min                                                                                                                                                                                                                    | diviser la posologie par 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |
| FG < 15 ml/min                                                                                                                                                                                                                         | diviser la posologie par 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                              |                       |                     |                            |                |                            |

| MODALITÉS D'ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                            | INFORMATIONS PRATIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Voie orale</li> <li>Avaler les comprimés en position assise ou debout, au milieu d'un repas, avec un grand verre d'eau (éviter le risque d'ulcération œsophagienne)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas s'allonger ou se coucher pendant les 30 minutes suivant la prise des comprimés</li> <li>SELEXID® peut avoir une influence importante sur l'aptitude à conduire des véhicules / utiliser des machines du fait du risque d'encéphalopathie (confusion, troubles de la conscience, épilepsie, ou mouvement anormaux)</li> </ul> |

## VIGILANCE

| CONTRE-INDICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EFFETS INDÉSIRABLES                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hypersensibilité à la substance active, aux pénicillines ou à l'un des excipients</li> <li>Antécédent d'une réaction d'hypersensibilité immédiate sévère (anaphylaxie...) à une autre bêta-lactamine (céphalosporine, carbapénème ou monobactame...)</li> <li>Toute affection susceptible de retarder le transit ou la vidange œsophagienne</li> <li>Anomalies génétiques du métabolisme entraînant un déficit sévère en carnitine (défaut du transporteur de la carnitine / acidurie méthylmalonique / acidémie propionique...)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EI fréquents (≥ 1/100 et &lt; 1/10) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mycose vulvovaginale</li> <li>Diarrhées, nausées</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour voir l'ensemble des EI, cf. Effets indésirables de la monographie</p> |

SUITE ►

NOVEMBRE 2020

## VIGILANCE (suite)

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Hypersensibilité** : rechercher les antécédents de réactions d'hypersensibilité aux pénicillines, céphalosporines ou à d'autres bêta-lactamines. Si survenue d'une manifestation allergique : arrêter SELEXID®
- **Colite pseudomembraneuse** : si survenue d'une diarrhée après l'utilisation de Selexid®, envisager ce diagnostic
- **Ulcerations oesophagiennes** : respecter les modalités d'administration pour réduire le risque
- **Porphyrie** : ne pas utiliser (risque de crise aiguë)
- **Encéphalopathie** : risque associé aux bêta-lactamines, particulièrement si surdosage ou d'insuffisance rénale
- **Méthotrexate** : déconseillé
- **Acide valproïque / valproate** : déconseillé (augmente le risque de déficit en carnitine)
- **Selexid® en traitement au long cours ou répété** : prudence car risque de déficit en carnitine (symptômes incluant douleurs musculaires, fatigue et confusion)

Pour voir le détail des mises en garde, cf. **Mises en garde** de la monographie

- **GROSSESSE** : SELEXID® peut être utilisé pendant la grossesse si nécessaire
- **ALLAITEMENT** : possible

### INTERACTIONS

- **Déconseillées** :
  - Méthotrexate
  - Acide valproïque / valproate
- **À prendre en compte** :
  - Probénécide
  - Produits bactériostatiques (érythromycine, tétracyclines...)

Pour voir le détail des interactions, cf. **Interactions** de la monographie

Cliquez ici  
pour voir  
la monographie

