

Que faut-il savoir sur Xarelto ?

- ◆ Xarelto fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- ◆ Xarelto doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. N'oubliez jamais de prendre votre traitement afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- ◆ Vous ne devez jamais arrêter de prendre Xarelto sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.

- ◆ Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre Xarelto.
- ◆ Informez votre médecin que vous êtes traité par Xarelto avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à un médecin ou à un pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Xarelto, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Les saignements sont

l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre Xarelto sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin. Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- ◆ douleurs
- ◆ gonflement ou sensations d'inconfort
- ◆ maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ◆ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper
- ◆ menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire

- ◆ sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- ◆ si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café.

Comment dois-je prendre Xarelto ?

- ◆ Pour garantir une protection optimale, Xarelto
 - 2,5 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 15 mg doit être pris au cours des repas,
 - 20 mg doit être pris au cours des repas.

Carte de Surveillance du Patient

Xarelto 2,5 mg

Xarelto 10 mg

Xarelto 15 mg

Xarelto 20 mg



◆ **Gardez toujours cette carte sur vous**

◆ **Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste que vous consultez avant de commencer un traitement**

Je suis sous traitement anticoagulant par Xarelto (rivaroxaban).

Nom :

Autres médicaments / Pathologies :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Poids :

En cas d'urgence,
veuillez prévenir :

Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

Cachet du médecin :

Veuillez aussi prévenir :

Nom :

Téléphone :

Lien avec le patient :

Information
à destination
des professionnels
de santé :

- ◆ Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Xarelto.



Signature Page for MA-XAR-FR-0189 v1.0

Regulatory Approval	Sophie Segard Regulatory 23-Mar-2022 14:32:10 GMT+0000
---------------------	--

Signature Page for MA-XAR-FR-0189 v1.0